

患者情報

YESCARTA®およびTECARTUS®は副作用が起こることがあり、それによって死に至ることもあります。

以下の症状が1つでもある場合は、すぐに担当がん専門医に連絡するか救急支援を受けてください。

- 発熱 (100.4°F/38°C以上)
- 息苦しさ
- 寒気、または体のふるえを伴う寒気
- 錯乱
- めまい、またはふらつき
- 重度の吐き気、嘔吐、または下痢
- 脈が速くなる、または不整脈
- ひどい疲労感または脱力感

YESCARTA、YESCARTAのロゴ、TECARTUS、TECARTUSのロゴ、KITE、およびKITEのロゴは、Kite Pharma, Inc.の商標です。GILEADはGilead Sciences, Inc.の商標です。

© 2023 Kite Pharma, Inc. 無断複写・転載を禁じます。 | REMS-TEC-0026 11/2023



FOLD



患者携帯カード

このカードは常に携帯してください。救急室に行くときや医師の診察を受けるときには、このカードを提示してください。

診察を受ける医療関係者に、YESCARTA®またはTECARTUS®による治療を受けていることを伝えてください。

YESCARTA®またはTECARTUS®による治療を受けてから少なくとも4週間は、治療を受けた医療機関の近く(2時間以内の距離)から離れないでください。

医療関係者向けの重要な情報

担当がん専門医氏名： _____

医療機関電話番号： _____

時間外電話番号： _____

投与されたKite CAR T製剤：

YESCARTA®

TECARTUS®

Kite CAR T注入日： _____

FOLD

- この患者さんは、CD19指向性遺伝子改変自己T細胞免疫療法 (CAR T) を受けています。
- CAR T療法はサイトカイン放出症候群 (CRS) および神経毒性を引き起こすことがあり、それにより死亡に至る、または生命が脅かされる可能性もあります。CRSは、どの臓器系にも起こる可能性があります
- **患者さんの担当がん専門医に速やかに連絡してお問い合わせください**



スキャンすると他の言語もご覧になれます。

詳細は、www.yescartatecartusrems.com をご覧ください