

## Informações do paciente

YESCARTA® e TECARTUS® podem causar efeitos colaterais que levam à morte.

Ligue ou consulte seu oncologista ou procure ajuda médica **IMEDIATAMENTE** se você tiver qualquer um **desses sintomas**:

- Febre (100,4 °F/38 °C ou mais)
- Dificuldade ao respirar
- Arrepios ou calafrios
- Confusão
- Tontura ou vertigem
- Náusea severa, vômito ou diarreia
- Batimento cardíaco rápido ou irregular
- Fadiga severa ou fraqueza

YESCARTA, o logotipo YESCARTA, TECARTUS, o logotipo TECARTUS, KITE e o logotipo KITE são marcas registradas da Kite Pharma, Inc. GILEAD é uma marca registrada da Gilead Sciences, Inc.

© 2023 Kite Pharma, Inc. Todos os direitos reservados. | REMS-TEC-0030 11/2023



FOLD



## Cartão de bolso do paciente

**Carregue esse cartão sempre com você. MOSTRE ESSE CARTÃO se você for para a emergência ou consultar qualquer médico.**

Diga para qualquer prestador de cuidados médicos que consultar que você está sendo tratado com YESCARTA® ou TECARTUS®.

Fique nas proximidades (dentro de 2 horas) do local em que você recebeu seu tratamento por pelo menos 4 semanas após receber a medicação YESCARTA® ou TECARTUS®.

## Informações importantes para provedores de cuidados médicos

Nome do oncologista responsável pelo tratamento: \_\_\_\_\_

Telefone do consultório: \_\_\_\_\_

Telefone para horário fora do expediente: \_\_\_\_\_

Produto CAR-T Kite administrado:

YESCARTA®

TECARTUS®

Data da infusão CAR-T Kite: \_\_\_\_\_

FOLD

- Esse paciente recebeu uma imunoterapia com células T autólogas geneticamente modificadas direcionadas a CD19 (CAR-T).

- **A terapia CAR-T pode causar síndrome de liberação de citocinas (SLC) e toxicidades neurológicas que podem ser fatais ou ameaçar a vida. SLC pode envolver qualquer sistema de órgãos**



- **Entre em contato com o oncologista do paciente imediatamente para informações detalhadas**

**Para mais informações, acesse [www.yescartatecartusrems.com](http://www.yescartatecartusrems.com).**



**Digitalize para mais idiomas.**