

Patienteninformationen

YESCARTA® und TECARTUS® können Nebenwirkungen haben, die potenziell tödlich sind.

Wenden Sie sich bei den **folgenden Symptomen UNVERZÜGLICH** an Ihren Onkologen oder die medizinische Notfallversorgung:

- Fieber (100,4 °F/38 °C oder höher)
- Starke Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall
- Atembeschwerden
- Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag
- Übermäßiges Frieren oder Schüttelfrost
- Starke Müdigkeit oder Schwächegefühl
- Verwirrung
- Benommenheit oder Schwindelgefühl

YESCARTA, das YESCARTA Logo, TECARTUS, das TECARTUS Logo, KITE und das KITE Logo sind Marken von Kite Pharma, Inc. GILEAD ist eine Marke von Gilead Sciences, Inc.

© 2023 Kite Pharma, Inc. Alle Rechte vorbehalten. | REMS-TEC-0025 11/2023



FOLD



Patientenkarte

Tragen Sie diese Karte ständig bei sich. ZEIGEN SIE DIESE KARTE falls Sie die Notaufnahme aufsuchen und bei jedem Arztbesuch.

Informieren Sie alle Ärzte und Pflegekräfte, dass Sie mit YESCARTA® oder TECARTUS® behandelt werden.

Halten Sie sich nach der Behandlung mit YESCARTA® oder TECARTUS® mindestens 4 Wochen lang in der Nähe (innerhalb von 2 Stunden erreichbar) des Ortes auf, an dem Sie behandelt wurden.

Wichtige Informationen für Ärzte und Pflegekräfte

Name des behandelnden Onkologen: _____

Diensttelefon: _____

Telefonnummer nach Dienstschluss: _____

Verabreichtes Kite CAR-T-Produkt:

YESCARTA®

TECARTUS®

Datum der Infusion mit Kite CAR-T: _____

FOLD

- Diesem Patienten wurde eine gegen CD19 gerichtete Immuntherapie mit genetisch modifizierten autologen T-Zellen (CAR-T) verabreicht.

- CAR-T-Therapie kann das Zytokin-Freisetzungssyndrom (CRS) und neurologische Toxizitäten verursachen, die potenziell tödlich oder lebensbedrohlich sind. CRS kann alle Organsysteme betreffen



- **Wenden Sie sich unverzüglich an den behandelnden Onkologen für weitere Informationen**

Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.yescartatecartusrems.com.



Für weitere Sprachen scannen.