

환자 정보

YESCARTA® 및 TECARTUS®는 사망으로 이어질 수 있는 부작용을 일으킬 수 있습니다.

다음 증상 중 하나라도 있으면 즉시 담당 종양전문의에게 전화하거나 진료를 받거나 응급 도움을 받으십시오.

- 열 (100.4°F/38°C 이상)
- 호흡 곤란
- 오한 또는 몸이 덜덜 떨리는 오한
- 혼동 상태
- 현기증 또는 어지럼
- 심한 오심, 구토, 또는 설사
- 빠르거나 불규칙한 심장 박동
- 심한 피로 또는 쇠약

YESCARTA, YESCARTA Logo, TECARTUS, TECARTUS Logo, KITE, 및 KITE Logo는 Kite Pharma, Inc.의 상표입니다. GILEAD는 Gilead Sciences, Inc.의 상표입니다.

© 2023 Kite Pharma, Inc. 제반 권리 당사 보유. | REMS-TEC-0027 11/2023



FOLD



환자 지갑 카드

이 카드를 항상 휴대하십시오. 응급실에 가거나 의사의 진료를 받는 경우 이 카드를 보여주십시오.

진료를 보는 어떠한 의료서비스 제공자에도 YESCARTA® 또는 TECARTUS®로 치료를 받고 있다고 알려주십시오.

YESCARTA® 또는 TECARTUS®로 치료를 받은 후 최소 4주 동안 치료를 받은 장소에서 (2시간 내의) 가까운 지역 내에 머무십시오.

의료서비스 제공자에 대한 중요한 정보

치료 담당 종양전문의 성명: _____

진료실 전화: _____

진료 시간 후 전화: _____

투여된 Kite CAR T 제품:

YESCARTA®

TECARTUS®

Kite CAR T 주입 날짜: _____

FOLD

- 이 환자는 CD19를 표적으로 한 유전자 변형 자가 T세포 면역요법(CAR T)을 받았습니다.
- CART 요법은 사이토카인 방출 증후군 (CRS) 및 신경 독성을 야기할 수 있으며, 이는 치명적이거나 생명을 위협할 수 있습니다. CRS는 어떤 장기 체계에도 영향을 미칠 수 있습니다.
- **즉시 환자 담당 종양전문의에게 문의하여 자세한 정보를 알아보십시오.**



더 많은 언어로 보려면
스캔하십시오.

더 상세한 정보를 원하시면, www.yescartatecartusrems.com를 방문하십시오.