

Thông tin về bệnh nhân

YESCARTA® và TECARTUS® có thể gây ra phản ứng phụ có thể dẫn đến tử vong.

Gọi điện thoại hoặc gặp bác sĩ chuyên khoa ung thư hoặc tìm cách được chăm sóc cấp cứu **NGAY LẬP TỨC** nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào sau đây:

- Sốt (100.4°F/38°C hoặc cao hơn)
- Chóng mặt hoặc choáng váng
- Khó thở
- Buồn nôn, ói mửa hoặc tiêu chảy trầm trọng
- Ớn lạnh hoặc run người vì ớn lạnh
- Tim đập nhanh hoặc nhịp tim không đều
- Bị lẫn lộn
- Mệt mỏi hoặc suy nhược trầm trọng

YESCARTA, biểu tượng YESCARTA, TECARTUS, biểu tượng TECARTUS, KITE và biểu tượng KITE là thương hiệu của Kite Pharma, Inc. GILEAD là thương hiệu của Gilead Sciences, Inc.

© 2023 Kite Pharma, Inc. Bảo lưu mọi quyền. | REMS-TEC-0033 11/2023



FOLD



Thẻ bệnh nhân giữ trong ví

Luôn mang theo thẻ này bên mình. TRÌNH THẺ NÀY khi quý vị đến phòng cấp cứu hoặc gặp bác sĩ nào khác.

Cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khám bệnh hay điều trị cho quý vị biết rằng quý vị đang được điều trị bằng YESCARTA® hoặc TECARTUS®.

Cần ở gần địa điểm quý vị được điều trị (trong vòng khoảng 2 giờ đường xe) trong ít nhất 4 tuần sau khi truyền YESCARTA® hoặc TECARTUS®.

Thông tin quan trọng dành cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Tên bác sĩ điều trị ung thư: _____

Điện thoại văn phòng: _____

Điện thoại sau giờ làm việc: _____


Thuốc CAR T của Kite được truyền:

YESCARTA®

TECARTUS®

Ngày truyền thuốc CAR T của Kite: _____

FOLD

- Bệnh nhân này đã được điều trị bằng phương pháp trị liệu miễn dịch tế bào T tự thân biến đổi gen theo hướng CD19 (CAR T)
- Phương pháp trị liệu CAR T có thể gây ra hội chứng phóng thích cytokine (CRS) và nhiễm độc thần kinh, có thể đe dọa đến tính mạng hoặc gây tử vong. CRS có thể ảnh hưởng đến bất kỳ hệ thống cơ quan nào 
- **Liên lạc ngay với bác sĩ ung thư của bệnh nhân để biết thêm thông tin**

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang www.yescartatecartusrems.com.



**Chụp quét để
xem thêm nhiều
ngôn ngữ khác.**