

## Información para el paciente

YESCARTA® y TECARTUS™ pueden causar efectos secundarios que pueden provocar la muerte.

Llame o consulte a su oncólogo o busque ayuda de urgencia **DE INMEDIATO** si tiene alguno de **estos síntomas**:

- Fiebre (100.4 °F/38 °C o más)
- Mareos o aturdimiento
- Dificultad para respirar
- Náuseas, vómitos o diarrea intensos
- Escalofríos o temblores
- Latido cardíaco rápido o irregular
- Confusión
- Fatiga o debilidad intensa

YESCARTA, el logotipo de YESCARTA, TECARTUS, el logotipo de TECARTUS, KITE, y el logotipo de KITE son marcas comerciales de Kite Pharma, Inc. GILEAD es una marca comercial de Gilead Sciences, Inc.

© 2020 Kite Pharma, Inc. Todos los derechos reservados. | REMS-CTF-0013 11/2020



DOBLAR



## Tarjeta de bolsillo del paciente

**Lleve esta tarjeta con usted en todo momento. MUESTRE ESTA TARJETA si va a un servicio de urgencias o si consulta a un médico.**

Informe al profesional sanitario que lo vea que está siendo tratado con YESCARTA® o TECARTUS™.

Permanezca muy cerca (a una distancia máxima de 2 horas) del lugar en el que recibió el tratamiento durante, al menos, 4 semanas después de recibir YESCARTA® o TECARTUS™.

## Información importante para profesionales sanitarios

DOBLAR

Nombre del oncólogo tratante: \_\_\_\_\_

Teléfono del consultorio: \_\_\_\_\_

Teléfono después del horario de atención: \_\_\_\_\_

Medicamento T-CAR de Kite que se administró:

YESCARTA®

TECARTUS™

Fecha de la infusión T-CAR de Kite: \_\_\_\_\_

- Este paciente ha recibido una inmunoterapia con linfocitos T (T-CAR) autólogos, modificados genéticamente y dirigidos a CD19.

- La terapia con T-CAR puede causar síndrome de liberación de citocinas (SLC) y efectos secundarios neurológicos, que pueden ser mortales o potencialmente mortales. El SLC puede afectar a cualquier aparato y sistema.



- **Comuníquese de inmediato con el oncólogo del paciente para obtener más información.**