

患者信息

YESCARTA®和 TECARTUS® 可引起可能导致死亡的副作用。

如果您出现以下任何症状，请立即致电或去看您的肿瘤科医生或寻求紧急帮助：

- 发热 (100.4°F/38°C 或更高)
- 呼吸困难
- 发冷或寒战
- 意识模糊
- 眩晕或头晕
- 重度恶心、呕吐或腹泻
- 心跳加快或不规则
- 重度疲乏或虚弱

YESCARTA、YESCARTA 徽标、TECARTUS、TECARTUS 徽标、KITE 和 KITE 徽标是 Kite Pharma, Inc. 的商标。GILEAD 是 Gilead Sciences, Inc. 的商标。
© 2021 Kite Pharma, Inc.保留所有权利。| REMS-CTF-0028 04/2021



折叠

 **YESCARTA**[®]
(axicabtagene ciloleucel) Suspension
for IV infusion

 **TECARTUS**[®]
(brexucabtagene autoleucel) Suspension
for IV infusion

患者钱包卡

随身携带这张卡片。如果您去急诊室或看任何医生，请出示此卡。

告知任何为您看诊的医务人员您正在接受 YESCARTA®或 TECARTUS® 治疗。

服用 YESCARTA®或 TECARTUS® 后，在您接受治疗的地点周围 (2 小时车程内) 停留至少 4 周。

医务人员的重要信息

治疗肿瘤学家姓名: _____

工作时间电话: _____

非工作时间电话: _____

Kite CAR T 产品给药:

YESCARTA®

TECARTUS®

Kite CAR T 输注日期: _____

- 该患者接受了 CD19 导向的转基因自体 T 细胞免疫治疗 (CAR T)。

- CAR T 治疗可引起细胞因子释放综合征 (CRS) 和神经毒性，可能致命或危及生命。
CRS 可能涉及任何器官系统

- **请立即联系患者的肿瘤科医生以获得更多信息**

请访问 www.yescartatecartusrems.com 获取更多信息。

